

平成 30 年 4 月

お客様 各位

製造販売元



「使用上の注意」の改訂のお知らせ

経皮鎮痛消炎剤

ケトプロフェンテープ[®] 20mg「BMD」 ケトプロフェンテープ[®] 40mg「BMD」 (ケトプロフェン含有プaster剤)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、自主改訂により「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。(__部:追記箇所)。

今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

また、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには、若干の日時を要するものと思われまますので、この点ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

改訂後 (下線部分__を追記)	改訂前														
<p>4. 副作用 (変更なし) (1) (変更なし) (2) その他の副作用</p> <table border="1"><thead><tr><th>頻度 分類</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>皮膚^{注)}</td><td>局所の発疹、発赤、腫脹、掻痒感、刺激感、 水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱 等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫</td></tr><tr><td>消化器</td><td>消化性潰瘍</td></tr></tbody></table> <p>注)このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。</p>	頻度 分類	頻度不明	皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、掻痒感、刺激感、 水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱 等	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫	消化器	消化性潰瘍	<p>4. 副作用 (省略) (1) (省略) (2) その他の副作用</p> <table border="1"><thead><tr><th>頻度 分類</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>皮膚^{注)}</td><td>局所の発疹、発赤、腫脹、掻痒感、刺激感、 水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱 等</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫</td></tr></tbody></table> <p>注)このような症状があらわれた場合は直ちに使用を中止すること。</p>	頻度 分類	頻度不明	皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、掻痒感、刺激感、 水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱 等	過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫
頻度 分類	頻度不明														
皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、掻痒感、刺激感、 水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱 等														
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫														
消化器	消化性潰瘍														
頻度 分類	頻度不明														
皮膚 ^{注)}	局所の発疹、発赤、腫脹、掻痒感、刺激感、 水疱・びらん、色素沈着、皮下出血、皮膚剥脱 等														
過敏症 ^{注)}	蕁麻疹、眼瞼浮腫、顔面浮腫														

DSU No.269 (2018年5月) 掲載

お問い合わせは、弊社担当 MR 又は品質保証部までご連絡ください。

TEL 03-3564-9200 FAX 03-3564-9201

以上