

平成 23 年 3 月

お客様 各位

製造販売元 株式会社バイオメディクス

## 「使用上の注意」の改訂のお知らせ

カルシタミンカプセル 0.25  $\mu$ g  
 カルシタミンカプセル 0.5  $\mu$ g  
 カルシタミンカプセル 1.0  $\mu$ g  
 カルシタミンカプセル 3  $\mu$ g  
 (アルファカルシドール製剤)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。この度、「使用上の注意」を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます（\_\_\_部：追記箇所）。今後のご使用に関しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

また、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われまますので、この点ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

改訂後（下線部分___を変更・追記）	改訂前																																	
<b>【使用上の注意】</b> 1. 変更なし 2. 相互作用 <b>併用注意</b> （併用に注意すること）	<b>【使用上の注意】</b> 1. 省略 2. 相互作用 <b>併用注意</b> （併用に注意すること）																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、 炭酸マグネシウム等</td> <td>変更なし</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>ジギタリス製剤 ジゴキシン等</td> <td>変更なし</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等</td> <td>変更なし</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>ビタミンD 及びその誘導体 カルシトリオール等</td> <td>変更なし</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>PTH 製剤 テリパラチド</td> <td>高カルシウム血 症があらわれる おそれがある。</td> <td>相加作用</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、 炭酸マグネシウム等	変更なし	変更なし	ジギタリス製剤 ジゴキシン等	変更なし	変更なし	カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等	変更なし	変更なし	ビタミンD 及びその誘導体 カルシトリオール等	変更なし	変更なし	PTH 製剤 テリパラチド	高カルシウム血 症があらわれる おそれがある。	相加作用	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、 炭酸マグネシウム等</td> <td>省略</td> <td>省略</td> </tr> <tr> <td>ジギタリス製剤 ジゴキシン等</td> <td>省略</td> <td>省略</td> </tr> <tr> <td>カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等</td> <td>省略</td> <td>省略</td> </tr> <tr> <td>ビタミンD 及びその誘導体 カルシトリオール等</td> <td>省略</td> <td>省略</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、 炭酸マグネシウム等	省略	省略	ジギタリス製剤 ジゴキシン等	省略	省略	カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等	省略	省略	ビタミンD 及びその誘導体 カルシトリオール等	省略	省略
薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																																
マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、 炭酸マグネシウム等	変更なし	変更なし																																
ジギタリス製剤 ジゴキシン等	変更なし	変更なし																																
カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等	変更なし	変更なし																																
ビタミンD 及びその誘導体 カルシトリオール等	変更なし	変更なし																																
PTH 製剤 テリパラチド	高カルシウム血 症があらわれる おそれがある。	相加作用																																
薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																																
マグネシウムを含有する製剤 酸化マグネシウム、 炭酸マグネシウム等	省略	省略																																
ジギタリス製剤 ジゴキシン等	省略	省略																																
カルシウム製剤 乳酸カルシウム水和物、 炭酸カルシウム等	省略	省略																																
ビタミンD 及びその誘導体 カルシトリオール等	省略	省略																																
3~8. 変更なし	3~8. 省略																																	

DSU No.198 (2011 年 4 月) 掲載

お問い合わせは、担当MR又は弊社品質保証部までご連絡下さい。

TEL 03-3564-9200 FAX 03-3564-9201

以上